

## Detaillierte Prognose für Plasmopara viticola und Rebwachstum

Eine Gemeinschaftsentwicklung von Agroscope CH (RAC Changins, FAW Wädenswil) und Staatl. Weinbauinstitut Freiburg (D)  
 Berechnung: Sporangien-dichte nach Dr. G. Hill, DLR Oppenheim; Rebwachstum nach Prof. Dr. H. Schultz, FA Geisenheim

Station: Station122, 06.01.2018 - 06.02.2018

Erstellt: 30.01.2018 06:06:00

Wetterdaten bis: 30.01.2018 04:00

Vorhersage bis: 06.02.2018 01:00

Keimbereitschaft: 0 %  
 Austrieb:

Wachstum angegeben für:  
 pro Haupttrieb (ohne Geiztriebe)

Spaetburgunder

Datum	Sporulation	Sporangien-dichte	Infektion	Inkubation		Temperatur °C			Nieder-schlag mm	Blattnässe		Wachstum		Bemerkungen
				30.01.	06.02.	Min.	Ø	Max.		Grad-std. bei Std. BN.	Blatt-zahl	Blatt-fläche cm²		
06.01.						5,2	6,5	7,8	5,1	23	220			
07.01.						3,7	4,8	5,7	0,1	7	261			
08.01.						3,5	4,9	6,4						
09.01.						0,3	3,4	7,3		12	20			
10.01.						2,0	5,6	8,4	0,8	14	46			
11.01.						4,4	5,5	7,2	4,2	23	156			
12.01.						3,5	4,8	5,8		20	235			
13.01.						3,0	4,2	5,9						
14.01.						-4,1	1,5	4,1		4				
15.01.						-4,5	0,6	4,3	1,6	13	21			
16.01.						2,5	5,3	8,2	2,3	6	38			
17.01.						0,3	2,8	5,5	3,0	2	2			
18.01.						1,3	4,8	10,8	1,3	3	9			
19.01.						-1,2	2,4	5,3	2,4	7	14			
20.01.						0,1	1,3	3,2	12,3	11	14			
21.01.						-0,8	1,5	4,6	0,5	11	26			
22.01.						-0,3	2,2	5,0	4,4	22	46			
23.01.						4,1	5,8	7,7						
24.01.						5,9	7,7	10,1						
25.01.						7,2	8,4	9,8	0,2	11	44			
26.01.						4,6	6,4	8,2	4,1	17	96			
27.01.						0,8	3,1	5,3	0,1	19	75			
28.01.						4,0	6,2	7,9	0,1		24			
29.01.						7,1	8,2	9,3						
30.01.						3,3	5,9	8,0	2,6	8	38			
31.01.						4,7	7,9	9,5	5,5	5	15			
01.02.						2,4	3,8	5,7	2,6	1	18			
02.02.						2,9	3,8	5,2	0,6		3			
03.02.						4,0	7,1	9,3	3,2	4	35			
04.02.						3,2	4,3	6,0	1,6	1	6			
05.02.						1,4	2,7	4,1						
06.02.						1,3	1,5	1,6						

Station: Station122, 06.01.2018 - 06.02.2018

Erstellt: 30.01.2018 06:06:00

Wetterdaten bis: 30.01.2018 04:00

Vorhersage bis: 06.02.2018 01:00

Keimbereitschaft: 0 %

Wachstum angegeben für:

Spaetburgunder

Austrieb: pro Haupttrieb (ohne Geiztriebe)

Datum	Sporulation	Sporangien- dichte	Infektion	Inkubation	Temperatur °C		Nieder- schlag mm	Blattnässe Grad- std. bei Std. BN.	Wachstum Blatt- fläche Blatt- zahl cm²	Bemerkungen
					Min.	Ø Max.				
				30.01.	06.02.					

Sporangien-dichte: Angabe in Anzahl Sporangien pro cm<sup>2</sup> Blattfläche \* 1000. Werte liegen zwischen 0 und 300.

Gradstunden bei Blattnässe: werden bei durchgehender Blattbenetzung auch über Tagesgrenzen hinweg aufsummiert. Infektion wird am Tag beginnender Blattbenetzung angegeben. Wenn "Gradstunden bei Blattnässe" größer 50 ist sind Infektionsbedingungen gegeben

Inkubation aktuell: Inkubationszeit in Prozent oder Datum des Abschlusses der Inkubationszeit (wenn erreicht).

Inkubation Vorhersage: Prozent der Inkubationszeit oder Datum anhand der Wettervorhersagedaten.

Datum der Keimbereitschaft: Berechnung bezogen auf Wettervorhersage

Infektion: Infektionsstärke ! gering !! mittel !!! hoch

Grau hinterlegt: Daten aus Wettervorhersage (sofern vorhanden).

Realisierung und Programmierung: Geosens Software- und Messsystementwicklung, www.geosens.com